

사용 설명서

수이샷® 피이디-에스엠 (SuiShot® PED-SM)

1. 원료약품 및 분량 (1두분 중)

가. 유효성분

° 돼지 유행성 설사병 바이러스(PEDV, SM98vac Strain-61P)-----
-----10^{4.5}TCID₅₀/dose 이상

나. 첨가제

° 트레할로오스, 인산이수소칼륨, 인산수소이칼륨, L-글루탐일나트륨,
젤라틴

2. 성상

회백색의 건조괴이며 희석액을 넣어 흔들면 쉽게 균등한 현탁액이 되며,
굵은 입자나 이물 및 이취가 없고 소분된 내용물의 성상이 균일하여야
한다.

3. 효능 및 효과

이 백신은 돼지 유행성 설사병에 의한 설사증을 예방할 목적으로 사용한
다.

4. 용법 및 용량

1) 동봉된 희석액으로 희석하여 2ml씩 근육접종한다.

2) 접종방법

- 기초접종 : 후보돈에 종부 5~6주전 및 2~3주전에 각각 2ml씩 근
육접종한다.
- 보강접종 : 초임돈 및 경산돈에 분만 5~6주전 및 2~3주전에 각각
2ml씩 근육접종한다.
- PEDV 불활화 백신(SuiShot® PT-100)의 추가접종시 더 좋은 효과
를 볼 수 있다.

5. 포장단위

5두분/병

6. 저장방법 및 유효기간

- 1) 저장방법 : 2~8℃의 냉장소에 보관
- 2) 유효기간 : 제조일로부터 24개월

7. 주의사항

1) 접종상의 주의

- 반드시 건강한 돼지에만 접종합니다.
- 백신 접종시 안전을 위해 두꺼운 장갑 등을 착용하십시오.
- 반드시 멸균된 주사기구를 사용합니다.
- 희석액과 백신액을 뽑을 때, 용기의 고무마개를 70% 알코올 솜으
로 소독하여 건조한 후 주사액을 뽑으며 주사시에는 혈관에 들어
가지 않도록 주의하십시오.
- 반드시 1두 1침 원칙을 지키십시오.
- 백신접종 후 적어도 1~2일간은 안정시키고 이동이나 심한 운동을
피하도록 해 주십시오.

2) 대상동물이 중대한 질병과 관련된 경우, 백신접종을 피하십시오.

3) 다음 동물에는 신중하게 접종하십시오.

- 가벼운 발열, 설사 등의 이상증상이 확인된 것.
- 질병치료 중이거나 치료 직후 시간적 간격이 부족한 경우.
- 뚜렷한 영양장애가 있는 경우.

4) 주사 후 일시적인 발열, 원기소실, 식욕부진을 나타낼 수 있습니다.

5) 출하 14일 이내의 돼지에는 접종하지 마십시오.

6) 취급상의 주의

- 직사일광, 가온 또는 동결은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하십시오.
- 개봉하여 주사침을 찔렀던 백신은 신속히 사용하며, 사용하고 남은
백신은 잡균의 혼입, 효력저하의 우려가 있으므로 사용하지 마십
시오.
- 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.
- 쓰고 남은 백신 및 사용한 백신용기는 안전하게 폐기하십시오.
- 백신을 손이나 손가락에 잘못 주사한 경우, 염증과 동통이 발생할
수 있어 즉시 라벨, 설명서 또는 포장지에 기재되어 있는 성분표를
외과의사에게 보여주고 상담과 진찰을 받습니다.

7) 수의사의 처방이나 지시에 따라 사용하십시오.

8) 기타 사항은 (주)중앙백신연구소나 판매업소에 문의하십시오.

중앙백신 연구소

www.cavac.co.kr

☎ 042-863-9308

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

SI-193D-01