



1. 원료약품 및 분량 (본제 1두분 중)

가. <i>Bordetella bronchiseptica</i>	10,000,000,000CFU이상
나. <i>Pasteurella multocida</i> type A	4,000,000,000CFU이상
다. <i>Pasteurella multocida</i> type D	2,000,000,000CFU이상
라. <i>Pasteurella multocida</i> type D cDNT	500 μ g
마. 돼지췌코바이러스 2형(CAKY98주)	$2.0 \times 10^{6.0}$ TCID ₅₀ 이상
바. Adjuvant(부기 1.)	25%
사. 불활화제(부기 2.)	0.2%이하

2. 제형 및 성상

- 가. 제형 : 생물학적제제
- 나. 성상 : 노란백색의 균일한 수성현탁주사액이며 정치하면 백신 내용물의 침전이 생기나 흔들면 쉽게 균등액이 되며 소분된 내용물의 성상이 균일하고 이물 이취가 없음

3. 제조방법

4. 효능 및 효과

돼지의 위축성비염 및 파스튜렐라페렴을 예방하며, 돼지췌코바이러스2형 관련질환을 예방하거나 바이러스배출을 감소

5. 용법 및 용량

- 가. 접종시기
 - 1) 후보돈 : 첫 종부 4~5주전 1차 접종, 1차 2주 후에 2차 접종
 - 2) 경산모돈 : 매 분만 2~3주전 접종

나. 접종방법

1두당 2.0ml씩 이근부 근육에 접종

6. 포장단위

5두/병, 10두/병, 15두/병, 25두/병, 50두/병

7. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 냉암소(2~8℃)에 보관

나. 용기종류 : 밀봉용기

다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

8. 주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

대상동물이 중대한 질병과 관련된 경우, 백신접종을 피하십시오.

나. 다음 환축에게는 신중히 투여할 것

- 1) 가벼운 발열, 설사 등의 이상증상이 확인된 것.
- 2) 질병치료 중이거나 치료 직후 시간적 간격이 부족한 경우.
- 3) 뚜렷한 영양장애가 있는 경우.

다. 부작용

- 1) 주사 후 일과성의 발열, 원기소실, 식욕부진이 나타날 수 있지만, 통상 3일 내에 회복됩니다.
- 2) 주사 후 30일 이내에는 주사부위에 반흔이 남아있을 수 있으므로 출하 30일 이내의 돼지에는 접종하지 마십시오.

라. 일반적 주의

- 1) 반드시 건강한 돼지에만 접종하십시오.
- 2) 사용전, 본 백신을 더운 물에 잘 진탕하여 약 25℃ 전후가 되도록 하여 사용하십시오. 사용 중에도 가끔 따뜻하게 진탕해 주십시오.
- 3) 멸균된 주사기구를 사용하며 1두 1침을 원칙으로 사용하십시오.
- 4) 백신접종시 안전을 위해 두꺼운 장갑 등을 착용하십시오.
- 5) 백신 용기의 고무마개를 70% 알코올 솜으로 소독하여 건조한 후 주사액을 뽑으며 주사시 혈관에 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 6) 개봉하여 주사침을 찔렀던 백신은 신속히 사용하며, 사용하고 남은 백신은 잡균의 혼입, 효력저하의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- 7) 백신을 손이나 손가락에 잘못 주사한 경우, 염증과 동통이 발생할 수 있어 즉시

백신액을 흡입하여 체외로 빼내야 합니다. 라벨, 설명서 또는 포장지에 기재되어 있는 성분표를 의사에게 보여주고 상담과 진찰을 받으십시오.

8) 백신접종 후 적어도 1~2일간은 안정시키고 이동이나 심한 운동을 피하십시오.

마. 저장상 주의사항

- 1) 직사일광, 가온 또는 동결은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하십시오.
- 2) 외관 및 내용상의 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.
- 3) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 정해진 저장방법을 준수하십시오.
- 4) 쓰고 남은 백신 및 사용한 백신용기는 안전하게 폐기하십시오.

바. 기타 주의사항

- 1) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 2) 수의사의 처방이나 지시에 따라 사용하십시오.
- 3) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어 본 후 사용하십시오.
- 4) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

9. 시험기준 및 시험방법

동물용의약품 국가출하승인 검정기준에 따름.

10. 비고

국가출하승인 동물용의약품

중앙백신 연구소

042-863-9308
대전광역시 유성구 유성대로 1476-37