

사용 설명서

포울샷® 오리간염 1 & 3 (PoulShot® DHAV 1 & 3)

1. 원료약품 및 분량 (본제 1수분 중)

가. 유효성분

° 오리 간염 A 바이러스 1형(DHAV-1, HSB주(P100))

-----10^{3.5} EID₅₀ 이상

° 오리 간염 A 바이러스 3형(DHAV-3, AP04203P100주)

-----10^{2.5} EID₅₀ 이상

나. 첨가제

° 솔비톨, 인산이수소칼륨, 인산수소이칼륨, L-글루탐산나트륨, 젤라틴, 정제수

다. 희석액

° 염화나트륨, 염화칼륨, 인산수소나트륨, 인산이수소칼륨, 정제수

2. 제형 및 성상

가. 제형: 생물학적 제제

나. 성상: 탁한 연한 분홍색 내지 연한 갈색의 동결건조 분말제제이며 이물 이취가 없고, 용해하면 균일한 현탁액이 됨.

3. 효능 및 효과

오리 바이러스성 간염의 예방

4. 용법 및 용량

가. 접종 시기

1일령 이상의 오리에서 사용 (3일령 이전에 접종하는 것을 권장)

나. 접종 방법

1) 근육접종법

백신을 상온(20~24℃)의 희석액으로 희석하여 0.2mL씩 흉부 또는 둔부 근육 부위에 접종

2) 피하접종법

백신을 상온(20~24℃)의 희석액으로 희석하여 0.2mL씩 경부 피하에 접종

2) 음수접종법

백신 접종 2시간 전부터 절수시킨 후, 2시간 이내에 모두 마실 수 있는 물에 용해하여 음수로 접종

5. 포장단위

500수분/병

6. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법: 냉암소(2~8℃)에 보관

나. 용기종류: 밀봉용기

다. 유효기간: 제조일로부터 24개월

7. 주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

1) 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 오리에는 사용하지 마십시오.

2) 질병에 감염되었거나 잠복중인 오리, 열이 있거나 영양장애가 심한 오리, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 오리, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 오리에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

오리의 위생 상태에 따라 간혹 백신접종 후에 식욕부진, 침울 등의 접종반응이 일어날 수 있으므로 수의사와 상담하여 항생제 및 영양제의 투여 등 적절한 처치를 하십시오.

다. 일반적 주의

1) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마시고 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

2) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.

3) 지정된 동물 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.

4) 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.

5) 취급자는 장갑, 마스크, 보호의 등 보호장비를 착용하여 직접적인 피부접촉이나 흡입을 피하여 주시기 바랍니다.

6) 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

7) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신 연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

라. 적용상의 주의

1) 음수접종 시 주의사항

가) 음수접종 시 급수기 및 급수통을 청결하게 세척한 후 사용하십시오.

나) 음수용기는 청결한 지하수로 깨끗이 닦아야 하며, 소독약은 절대 사용하지 마십시오.

다) 백신의 효력을 저해하지 않게 항균제를 포함한 음수투여약제와 음수소독약은 3~5일전에 사용을 중지합니다.

라) 백신 전 48시간과 백신투여 후 24시간 이내에는 소독제를 투여하지 마십시오.

마) 백신을 희석하는 물은 소독약이나 오염물질이 없는 깨끗한 물을 사용하십시오.

바) 희석음수는 지하수로서 산, 알칼리도가 강하지 않은 것이 좋으며, 탈지분유를 0.2% 가하여 사용하고, 수질이 나쁠 때는 0.4%를 가하여 사용하면 좋습니다.

사) 수돗물을 사용할 때는 반드시 끓인 후 냉각시키든가, 24시간 방치 후 사용하며, 탈지분유를 0.2~0.4% 되게 첨가하는 것이 좋습니다.

아) 희석한 백신은 열이나 직사광선 등에 노출시키지 마십시오.

자) 백신투여 전에 일정시간(더운 날씨에는 최소 2시간, 시원한 날씨에는 최소 4시간 이상) 음수의 공급을 제한하며, 백신용 해액이 다 소모되기 전에 음수를 추가공급하지 마십시오.

차) 백신 용해된 음수액이 모두 소비되면 소독제가 함유되지 않은 깨끗한 물로 정상적인 급수를 실시하십시오.

중앙백신 연구소

www.cavac.co.kr

☎ 042-863-9308

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

PI-216M-00

2) 그 외의 적용상 주의사항

- 가) 본제는 백신 접종 직전에 용해하며 용해한 백신은 충분히 섞은 후 바로 사용하십시오.
- 나) 접종 전에는 반드시 백신의 성상 및 이물의 혼입여부 등을 관찰한 후 이상이 있으면 사용하지 마십시오.
- 다) 안전성 유효성에 문제를 일으킬 수 있으므로 다른 제제 (백신, 항생제, 영양제 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 라) 각종 스트레스 요인 (환경변화, 사료변경, 수송 등)이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전 후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.

마. 저장상의 주의사항

- 1) 직사일광, 가온 또는 동결되었던 백신은 효력이 없을수 있으니 사용하지 마십시오.
- 2) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 3) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 저장방법을 준수하십시오.
- 4) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리하십시오.
- 5) 빈 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 6) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.